

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра цифровых технологий,
математики и экономики

Методическая разработка
к выполнению расчетно-графической работы
«Приложения дифференциального и интегрального исчислений
функций одной переменной», часть 1

по дисциплине: Математический анализ
название дисциплины

для направления (специальности) 09.03.01, 09.03.02
код направления (специальности)

Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии
наименование направления подготовки

бакалавриат, очная форма обучения

код и наименование специальности, форма обучения

Мурманск
2021

УДК 517.2(076)
ББК 22.161
М-54

Составитель – Кацуба Валентина Сергеевна, канд. физ.-мат. наук, доцент
кафедры цифровых технологий, математики и экономики

Методическая разработка к выполнению расчетно-графической работы
«Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной
переменной» по дисциплине «Математический анализ» рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры-разработчика цифровых технологий, математики и
экономики

«21» 06 2021 г., протокол № 12 .
дата

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. Общие организационно-методические указания..... | 4 |
| 2. Задание, план выполнения, требования к оформлению..... | 4 |
| 3. Список рекомендуемых источников | 5 |
| 4. Образец заданий одного варианта | 7 |
| 5. Пример выполнения заданий РГР | 8 |
| Задача 1..... | 8 |
| Задача 2..... | 9 |
| Задача 3..... | 17 |
| Задача 4..... | 18 |
| Задача 5..... | 19 |
| Задача 6..... | 20 |
| Приложение А. Образец оформления титульного листа | 21 |
| Приложение Б. Варианты заданий | 22 |

1. Общие организационно-методические указания

Расчетно-графическая работа «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной» предусмотрена во второй части дисциплины «Математический анализ» и состоит из двух частей, первая из которых относится к дифференциальному исчислению и вторая – к интегральному исчислению. Первая часть РГР включает в себя часть основных прикладных задач по модулю «Дифференциальное исчисление функций одной переменной». Кроме РГР, по этому модулю дисциплины проводится текущий контроль в форме самостоятельной работы «Техника дифференцирования и вычисление пределов по правилу Лопиталья».

Целевая установка: при выполнении РГР (часть 1) студент должен показать усвоенный материал по свойствам функции, исследованию функций с помощью производных, решению задач на наибольшее и (или) наименьшее значения функции (в том числе текстовых задач), решению задач на механический и геометрический смысл производных и приложения дифференциала.

2. Задание, план выполнения, требования к оформлению

РГР (часть 1) содержит 6 задач на основные приложения производной и дифференциала.

Содержание задач каждого варианта:

Задача 1. Найти наибольшее и наименьшее значения функции на замкнутом промежутке.

Задача 2. Провести полное исследование свойств функций и построить их графики (всего 3 функции).

Задача 3. Текстовая задача на наибольшее или наименьшее значение некоторой величины.

Задача 4. Задача на применение свойства дифференциала о его связи с приращением функции.

Задача 5. Задача на механический смысл первой и второй производных.

Задача 6. Задача на геометрический смысл производной.

В приложении А данной методической разработки приведены 33 варианта заданий.

Общие требования к оформлению РГР:

- решения задач должны быть оформлены рукописью в отдельной тетради;
- каждая задача должна иметь условие, подробное решение и ответ;
- в решении нужно ссылаться на теоретические факты (из темы РГР), на основании которых строится решение;
- построение чертежей (или рисунков), приведение подробных выкладок в решении обязательно;
- при сдаче работы на экспертизу к ней следует приложить распечатку условий задач выполненного варианта.

План выполнения РГР:

- Первая часть РГР выдается после самостоятельной работы по технике дифференцирования и выполняется студентом с помощью данной методической разработки, рекомендуемых учебных ресурсов и с использованием обучающей программы «Исследование функции и построение её графика» в течение двух – трех недель;
- Преподавателем может быть назначена защита РГР всей группе или отдельным студентам.

3. Список рекомендуемых учебных ресурсов

1. Конспект лекций «Дифференциальное исчисление функций одной переменной» ведущего преподавателя дисциплины, в том числе в электронной форме.
2. Обучающая программа «Исследование функции и построение графика». Разработчики: Возженников А.П., Кацуба В.С. – Мурманск, 2005.

3. Приложения производной функции одной переменной. Практикум по высшей математике. Составитель: Тихонова В.Ф. – Мурманск, 2004. (электронный вариант).
4. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 1 / Н. С. Пискунов. - Изд. стер. - Москва : Интеграл-Пресс, 2005, 2001. - 416 с.
5. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. [В 2 ч.]. Ч. 1 / Д. Т. Письменный. - 16-е изд. ; 15-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2018, 2017. – 279 с. (и предыдущие издания).
6. Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. - Изд. 15-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. - 735, [1] с. : ил. (и предыдущие издания).
7. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - Москва : Мир и Образование : Астрель : Оникс, [2012]. - 368 с. (предыдущие и последующие издания).

4. Образец заданий одного варианта

Наибольшее количество баллов: 8

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив её график на этом промежутке, если $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$, $x \in [-2; 4]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^2}{e^x} + 1; \quad 2) y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}; \quad 3) y = \frac{x^2 + 5}{x-1}.$$

Задача 3

Найти соотношение между радиусом R и высотой H цилиндра, имеющего при данном объеме V наименьшую площадь полной поверхности.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(1,05)$, если $f(x) = e^{0,1x(1-x)}$.

Задача 5

Баржу, палуба которой на 4 м ниже уровня пристани, подтягивают к пристани при помощи каната. Канат наматывают на ворот с постоянной скоростью 2 м/сек. Определить, с каким ускорением a движется баржа в момент, когда она удалена от пристани на расстоянии 8 метров (по горизонтали).

Задача 6

Составить уравнения касательных и нормалей к окружности $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 3 = 0$ в точках ее пересечения с осью OX . Сделать чертеж.

5. Примеры выполнения заданий РГР

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив её график на этом промежутке, если $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5$, $x \in [-2; 4]$.

Решение

Данная функция является непрерывной на данном замкнутом промежутке, поэтому она имеет на этом промежутке наибольшее и наименьшее значения (это гарантируется теоремой Вейерштрасса о свойствах непрерывных функций на замкнутых промежутках).


Наибольшее и наименьшее значения функции могут достигаться в точках локальных экстремумов внутри отрезка или на концах отрезка.

Находим точки локальных экстремумов данной функции внутри данного отрезка, используя для этого необходимые и достаточные условия, связанные с первой производной функции:

$$f'(x) = 6x^2 + 6x \Rightarrow$$

$f'(x) = 0$, т.е. $6x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow 6x(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ или $x = -1$ - это стационарные точки данной функции и обе они находятся внутри отрезка $x \in [-2; 4]$;

проверяем достаточные условия экстремумов в стационарных точках:



$$y_{\max} = f(-1) = -4, \quad y_{\min} = f(0) = -5.$$

Находим значения $f(x)$ на концах данного промежутка:

$$f(-2) = -9, \quad f(4) = 171.$$


Схематично строим график функции на заданном промежутке

и по графику определяем, что

$$y_{\max} = 171 \text{ при } x = 4, \quad y_{\min} = -9 \text{ при } x = -2.$$

Ответ:

функция $y = 2x^3 + 3x^2 - 5$ на промежутке $x \in [-2; 4]$ имеет наибольшее значение $y = 171$, которое достигается при $x = 4$, и наименьшее значение $y = -9$, которое достигается при $x = -2$.



Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^2}{e^x} + 1; \quad 2) y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}; \quad 3) y = \frac{x^2 + 5}{x-1}.$$

Решение

1. $y = \frac{x^2}{e^x} + 1$

1) ООФ: $x \in (-\infty; +\infty)$;

2) ОЗФ, нули функции, промежутки знакопостоянства: $y \in [1; +\infty) \Rightarrow$ нулей функции нет;
 $y > 0$ при $\forall x \in \text{ООФ}$;

3) непрерывность, точки разрыва, вертикальные асимптоты:

функция непрерывна на своей ООФ, так как является элементарной, следовательно, нет точек разрыва, поэтому нет вертикальных асимптот;

4) четность, периодичность:

функция может обладать свойством четности, так как её ООФ симметрична относительно нуля;

$$y(-x) = \frac{(-x)^2}{e^{-x}} + 1 = x^2 \cdot e^x + 1 \neq \begin{cases} y(x) \\ -y(x) \end{cases} \text{ — функция ни четная, ни нечетная;}$$

функция не является периодической;


5) монотонность, локальные экстремумы:

$$y'_x = \frac{2 \cdot x \cdot e^x - x^2 \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(2x - x^2)}{e^{2x}} = \frac{2x - x^2}{e^x};$$

необходимое условие экстремумов:

$$y'_x = 0 \Leftrightarrow \frac{2x - x^2}{e^x} = 0 \Leftrightarrow 2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow x(2 - x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \text{ — это стационарные точки;}$$

достаточные условия монотонности и экстремумов:




значения локальных экстремумов:

$$y_{\min} = y(0) = \left. \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right) \right|_{x=0} = 1;$$

$$y_{\max} = y(2) = \left. \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right) \right|_{x=2} = \frac{4}{e^2} + 1 \approx 1,54;$$

$y \downarrow$ на промежутках $x \in (-\infty; 0)$ и $x \in (2; +\infty)$;

$y \uparrow$ на промежутке $x \in (0; 2)$;




6) вогнутость, выпуклость, точки перегиба:

$$y''_x = \left(\frac{2x - x^2}{e^x} \right)' = \frac{(2 - 2x)e^x - e^x(2x - x^2)}{e^{2x}} = \frac{e^x(2 - 2x - 2x + x^2)}{e^{2x}} = \frac{x^2 - 4x + 2}{e^x};$$

необходимое условие перегибов:

$$y'' = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x + 2}{e^x} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,6 \\ x_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,4 \end{cases} \text{ — это точки,} \\ \text{подозрительные на} \\ \text{перегиб}$$

достаточные условия выпуклости, вогнутости, точек перегиба:



ординаты точек перегиба:

$$y_{\text{перегиба}} = y(0,6) = \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right)_{x=0,6} \approx 1,2; \quad y_{\text{перегиба}} = y(3,4) = \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right)_{x=3,4} \approx 1,4;$$

график функции имеет две точки перегиба $(0,6; 1,2)$ и $(3,4; 1,4)$, является вогнутым на промежутках $x \in (-\infty; 0,6)$ и $x \in (3,4; +\infty)$ и является выпуклым на промежутке $x \in (0,6; 3,4)$;

7) наклонные и горизонтальные асимптоты:

если график имеет наклонную асимптоту, то её уравнение $y = kx + b$, где

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx);$$

так как $e^x \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$ и $e^x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow -\infty$, то для данной функции нужно отдельно рассматривать эти пределы при $x \rightarrow +\infty$ и при $x \rightarrow -\infty$:

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^2}{e^x} + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{e^x} + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x \cdot e^{-x} + \frac{1}{x} \right) = \infty \Rightarrow \text{при } x \rightarrow -\infty \text{ асимптот нет};$$

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right) = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \xrightarrow{\text{пр. Лопиталя}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^x - e^x x^2}{e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - x^2}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{e^x} = 0;$$

так как $k = 0$, то $b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right) =$


$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + e^x}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + e^x}{e^x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e^x} + 1 \right) = 1;$$

прямая $y = 1$ является горизонтальной асимптотой, но только при $x \rightarrow +\infty$;

8) дополнительные точки графика:

$$y(-1) = \left(\frac{x^2}{e^x} + 1 \right) \Big|_{x=-1} = e + 1 \approx 3,7; \quad y(0) = 1.$$

Ответ 1: график функции $y = \frac{x^2}{e^x} + 1$



Сводная таблица свойств функции $y = \frac{x^2}{e^x} + 1$:

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| x | $(-\infty; 0)$ | 0 | $(0; 0,6)$ | 0,6 | $(0,6; 2)$ | 2 | $(2; 3,4)$ | 3,4 | $(3,4; +\infty)$ |
| $y'(x)$ | - | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - |
| $y''(x)$ | + | + | + | 0 | - | - | - | 0 | + |
| $y(x)$ | | min $y=1$ | | перегиб $y \approx 1,2$ | | max $y \approx 1,54$ | | перегиб $y \approx 1,4$ | |

Горизонтальная асимптота: $y=1$ только при $x \rightarrow +\infty$. ОЗФ: $y \in [1; +\infty)$.

2. $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$

1) ООФ: $x \in (-\infty; +\infty)$;

2) непрерывность, точки разрыва, вертикальные асимптоты:

функция непрерывна на всей ООФ, т.е. при $\forall x \in (-\infty; +\infty)$, так как является элементарной, следовательно, точек разрыва нет и вертикальных асимптот нет;

3) четность, нечетность, периодичность:



функция может обладать свойством четности, так как её ООФ симметрична относительно нуля;

$$f(-x) = (-x-1) \cdot \sqrt[3]{(-x)^2} \neq \begin{cases} f(x) \\ -f(x) \end{cases} \Rightarrow \text{функция не является ни четной, ни нечетной};$$

функция не является периодической;

4) нули функции и промежутки знакопостоянства:

$$y = 0 \Leftrightarrow (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } x = 1;$$




5) монотонность, локальные экстремумы:

$$y'_x = \sqrt[3]{x^2} + \frac{2x(x-1)}{3 \cdot \sqrt[3]{x^4}} = \sqrt[3]{x^2} + \frac{2(x-1)}{3 \cdot \sqrt[3]{x}} = \frac{3x + 2x - 2}{3 \cdot \sqrt[3]{x}} = \frac{5x - 2}{3 \cdot \sqrt[3]{x}};$$

необходимое условие экстремумов


$$\begin{cases} y' = 0 \text{ при } x = \frac{2}{5} = 0,4 \\ y' \text{ не } \exists \text{ при } x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{функция имеет две критические точки } x_1 = 0,4 \text{ и} \\ x_2 = 0, \text{ причем, точка } x_2 \text{ является подозрительной на} \\ \text{острый экстремум;} \end{cases}$$

достаточные условия монотонности и экстремумов:



$$y_{\max} = y(0) = \left(\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1) \right)_{x=0} = 0$$

$$y_{\min} = y(0,4) = \left(\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1) \right)_{x=0,4} = (0,4-1) \cdot \sqrt[3]{0,16} \approx -0,6 \cdot 0,54 = -0,324;$$




б) вогнутость, выпуклость, точки перегиба:

$$y''_x = \frac{1}{3} \left(\frac{5x-2}{\sqrt[3]{x}} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{5 \cdot \sqrt[3]{x} - (5x-2) \cdot \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{15x - 5x + 2}{3 \sqrt[3]{x^2} \cdot 3 \sqrt[3]{x^2}} = \frac{2 \cdot (5x+1)}{9 \sqrt[3]{x^2}};$$

необходимые условия для точки перегиба:

$$\begin{cases} y'' = 0 \text{ при } 5x+1=0, \text{ т. е. при } x = -0,2 \\ y'' \text{ не существует при } x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{функция имеет 2 точки, подозрительные} \\ \text{на перегиб;} \end{cases}$$

достаточные условия для выпуклости, вогнутости, точки перегиба:



знаки y''
 выпуклость/вогнутость y

ордината точки перегиба:

$$y(-0,2) = \left(\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1) \right) \Big|_{x=-0,2} \approx -0,41;$$

график функции имеет одну точку перегиба $(-0,2; -0,41)$, является выпуклым на промежутке $x \in (-\infty; -0,2)$ и является вогнутым на промежутке $x \in (-0,2; +\infty)$;

7) наклонные и горизонтальные асимптоты:

если график имеет наклонную асимптоту, то её уравнение $y = kx + b$, где

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 \cdot \sqrt[3]{x^2} \right) = \infty \Rightarrow$$

наклонных асимптот нет;

8) дополнительные точки графика:


$$y(-1) = \left(\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1) \right) \Big|_{x=-1} = -2; \quad y(2) = \left(\sqrt[3]{x^2} \cdot (x-1) \right) \Big|_{x=2} = \sqrt[3]{4} \approx 1,59.$$

Ответ 2: Сводная таблица свойств функции $y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}$:

| x | $(-\infty; -0,2)$ | $-0,2$ | $(-0,2; 0)$ | 0 | $(0; 0,4)$ | $0,4$ | $(0,4; +\infty)$ |
|----------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|------------------|
| $y'(x)$ | + | + | + | не \exists | - | 0 | + |
| $y''(x)$ | - | 0 | + | не \exists | + | + | + |
| $y(x)$ | | перегиб $y = -0,41$ | | 0 | | min $y = -0,324$ | |

Асимптот у графика нет. ОЗФ: $y \in (-\infty; +\infty)$.

График функции $y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}$



3. $y = \frac{x^2 + 5}{x - 1}$

1) ООФ: $x \neq 1$, то есть $x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$;

2) нули функции, промежутки знакопостоянства функции:

$$y = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 5}{x - 1} = 0 \Leftrightarrow x^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset \Rightarrow \text{нулей функции нет;}$$

$y < 0$ на промежутке $x \in (-\infty; 1)$, $y > 0$ на промежутке $x \in (1; +\infty)$;

3) непрерывность, точки разрыва, вертикальные асимптоты:

функция имеет точку разрыва $x = 1$, так как эта точка не принадлежит ООФ, но её окрестность входит в ООФ; чтобы узнать поведение функции в окрестности точки разрыва $x = 1$, нужно вычислить односторонние пределы функции при условии $x \rightarrow 1 \pm 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \left(\frac{x^2 + 5}{x - 1} \right) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1-0} \left(\frac{x^2 + 5}{x - 1} \right) = -\infty \Rightarrow$$

$x = 1$ - точка бесконечного разрыва (разрыв второго рода),

прямая $x = 1$ является вертикальной асимптотой графика функции;

4) четность, периодичность:

ООФ не является симметричной относительно нуля, поэтому функция не может обладать свойством четности/нечетности, следовательно, функция не является ни четной, ни нечетной; также функция не является периодической;

5) монотонность, локальные экстремумы:

$$y'_x = \left(\frac{x^2 + 5}{x - 1} \right)' = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 5)}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 5}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 5}{(x - 1)^2};$$


необходимое условие экстремумов:

$$y'_x = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x - 5}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 5 = 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \sqrt{6} \approx -1,45 \\ x_2 = 1 + \sqrt{6} \approx 3,45 \end{cases};$$

y'_x не существует при $x = 1$, но эта точка не входит в ООФ, поэтому не является

подозрительной на экстремум;

достаточные условия монотонности и экстремумов:



монотонность y

вычисляем значения экстремумов функции:

$$y_{\max} = y(1 - \sqrt{6}) = \left. \left(\frac{x^2 + 5}{x - 1} \right) \right|_{x \approx -1,45} \approx -2,9;$$

$$y_{\min} = y(1 + \sqrt{6}) = \left. \frac{x^2 + 5}{x - 1} \right|_{x \approx 3,45} \approx 6,9;$$
 данная функция возрастает на промежутках

$x \in (-\infty; -1,45)$, $x \in (3,45; +\infty)$ и

убывает на промежутках $x \in (-1,45; 1)$, $x \in (1; 3,45)$,

имеет два локальных экстремума:

$y_{\max} \approx -2,9$ при $x \approx -1,45$ и $y_{\min} \approx 6,9$ при $x \approx 3,45$;

6) вогнутость/выпуклость, точки перегиба:

$$\begin{aligned} y'' &= \left(\frac{x^2 - 2x - 5}{(x-1)^2} \right)' = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2 - 2x - 5)(2(x-1))}{(x-1)^4} = \\ &= \frac{(2x-2)(x^2 - 2x + 1 - x^2 + 2x + 5)}{(x-1)^4} = \frac{12(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{12}{(x-1)^3}; \end{aligned}$$

необходимое условие точки перегиба:

$$y'' = 0 \Leftrightarrow \frac{12}{(x-1)^3} = 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset \Rightarrow \text{нет точек перегиба};$$

y'' не существует при $x = 1$, но эта точка не входит в ООФ, поэтому в ней перегиб быть не может;

достаточное условие выпуклости/вогнутости:




график функции является выпуклым на промежутке $x \in (-\infty; 1)$ и является вогнутым на промежутке $x \in (1; +\infty)$;

7) наклонные и горизонтальные асимптоты:

$$y = kx + b, \text{ где } k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx);$$

вычисляем числа k и b для данной функции:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 5}{(x-1)x} \right) = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{5}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = 1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 5}{x-1} - x \right) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 5 - x^2 + x}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+x}{x-1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(\frac{5}{x} + 1 \right)}{x \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = 1;$$

по найденным числам k и b делаем вывод, что $y = x + 1$ – это уравнение наклонной асимптоты.


Ответ 3: Сводная таблица свойств функции $y = \frac{x^2 + 5}{x-1}$:

| x | $(-\infty; -1,45)$ | $-1,45$ | $(-1,45; 1)$ | 1 | $(1; 3,45)$ | $3,45$ | $(3,45; +\infty)$ |
|----------|--------------------|-------------------------|--------------|-----|-------------|------------------------|-------------------|
| $y'(x)$ | + | 0 | - | | - | 0 | + |
| $y''(x)$ | - | - | - | | + | + | + |
| $y(x)$ | | max $y \approx -2,9$ | | | | min $y \approx 6,9$ | |

$y = x + 1$ – уравнение наклонной асимптоты, $x = 1$ – уравнение вертикальной асимптоты.

ОЗФ: $y \in (-\infty; -2,9) \cup (6,9; +\infty)$.

График функции $y = \frac{x^2 + 5}{x-1}$




Задача 3

Найти соотношение между радиусом R и высотой H цилиндра, имеющего при данном объеме V наименьшую площадь полной поверхности.

Решение

Очевидно, что можно рассматривать бесконечное множество цилиндров, имеющих фиксированный объём, варьируя значения радиуса основания R и высоты H . Если записать известную формулу для объема цилиндра:



$V = \pi R^2 H$, то становится понятно, что из двух размеров цилиндра R и H только один размер остаётся независимым, а другой выражается через него:

$$\text{так как по условию задачи } V = \text{const}, \text{ то } H = \frac{V}{\pi R^2}.$$

Составим площадь полной поверхности цилиндра как функцию одной переменной R :

$$S_{\text{пов}} = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot H = 2\pi R^2 + \frac{2\pi R \cdot V}{\pi R^2} = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R} \Rightarrow S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}, R \in (0; +\infty).$$


Таким образом, математическая модель задачи получилась в виде функции одной переменной, для которой требуется найти значение аргумента R , при котором составленная функция $S(R)$ имеет наименьшее значение.

Найдем S' и точку R_0 , подозрительную на локальный экстремум:

$$S' = \left(2\pi R^2 + \frac{2V}{R} \right)'_R = 2\pi \cdot 2R + \frac{0 \cdot R - 2V \cdot 1}{R^2} = 4\pi R - \frac{2V}{R^2};$$

$$S' = 0, \text{ то есть } 4\pi R - \frac{2V}{R^2} = 0 \Leftrightarrow 2\pi R = \frac{V}{R^2} \Leftrightarrow R^3 = \frac{V}{2\pi} \Rightarrow R_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$


Проверим достаточное условие экстремума в точке R_0 :



нарисуем схематичный график функции $S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}$

и по графику определим, что

$$S_{\text{наим}} = S_{\text{мин}} = S(R_0), \text{ где } R_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$



Вычисляем значение H при значении $R = R_0$:

$$H = \frac{V}{\pi R^2} \Big|_{R=R_0} = \frac{V}{\pi \cdot \sqrt[3]{\frac{V^2}{(2\pi)^2}}} = \frac{V^{\frac{1}{3}} \cdot 2}{\pi^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{3}}} = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \cdot 2 \Rightarrow H = 2R.$$

В результате решения задачи получено, что при фиксированном объеме цилиндр будет иметь наименьшую площадь полной поверхности в том случае, когда его высота в два раза больше радиуса основания.

Ответ: $2R = H$.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(1,05)$, если $f(x) = e^{0,1x(1-x)}$.

Решение

Используем следующие теоретические факты:

$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ – формула для приращения функции $f(x)$ в точке x , вызванного приращением аргумента Δx ;

$\Delta f \approx df$ – связь между приращением дифференцируемой функции и её дифференциалом, справедливая при малых приращениях аргумента Δx ;

$df = f'(x) \cdot \Delta x$ – формула для вычисления дифференциала функции $f(x)$.

Тогда из совокупности этих теоретических фактов получаем, что

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta f \approx f(x) + df = f(x) + f'(x) \cdot \Delta x,$$

то есть при малых Δx значение функции $f(x)$ в некоторой приращенной точке $(x_0 + \Delta x)$ можно вычислить по следующей приближенной формуле:

$$\boxed{f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x} \quad (*)$$

В данной задаче имеем:

$$x_0 + \Delta x = 1,05 = 1 + 0,05 \Rightarrow x_0 = 1, \Delta x = 0,05;$$

$$f(x_0) = f(1) = e^{0,1x(1-x)} \Big|_{x=1} = e^0 = 1;$$

$$f'_x = (e^{0,1x(1-x)})'_x = e^{0,1x(1-x)} (0,1x - 0,1x^2)' = e^{0,1x(1-x)} \cdot (0,1 - 0,2x) \Rightarrow$$

$$f'(x_0) = f'(1) = 1 \cdot (-0,1) = -0,1;$$

$$f(1,05) = f(1 + 0,05) \approx f(1) + f'(1) \cdot 0,05 = 1 - 0,1 \cdot 0,05 = 1 - 0,005 = 0,995.$$

При вычислении приближенного значения функции $f(x)$ по формуле (*) получается погрешность, совпадающая с погрешностью при замене приращения этой функции на ее дифференциал:

$\Delta f \approx df$ - погрешность ε этого приближенного равенства теоретически известна и является величиной более высокого порядка малости, чем приращение аргумента Δx :

$$\varepsilon = o(\Delta x), \Delta x \rightarrow 0.$$

В данной задаче $\Delta x = 0,05 = 5 \cdot 10^{-2}$, поэтому погрешность можно описать как величину, имеющую более высокий порядок малости, т.е. $\varepsilon \leq 10^{-3}$. Для понимания этого факта полезно вычислить искомое значение $f(1,05)$, где $f(x) = e^{0,1x(1-x)}$, используя калькулятор:

$f(x) = e^{0,1 \cdot 1,05 \cdot (1-1,05)} \approx 0,994764$; этот результат отличается от полученного значения по формуле (*) в третьем знаке после запятой, что согласуется с указанной величиной её погрешности ε .


Ответ: $f(1,05) \approx 0,995$.

Задача 5

Баржу, палуба которой на 4 метра ниже уровня пристани, подтягивают к пристани при помощи каната. Канат наматывают на ворот с постоянной скоростью 2 м/сек. Определить, с каким ускорением a движется баржа в момент, когда она удалена от пристани на расстоянии 8 метров (по горизонтали).

Решение

Рисунок к задаче:



S – расстояние от баржи до пристани (по горизонтали);

t – время, отсчитываемое от начала притягивания баржи к пристани;

t_0 – момент времени, в который баржа была удалена от пристани на 8 метров;

$$[S] = [1 \text{ м}], [t] = [1 \text{ сек}].$$

Закон движения баржи (функция $S(t)$) может быть составлен по теореме Пифагора:

$$S(t) = \sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16}, \text{ где } A_0 \text{ – начальная длина каната;}$$

$$\text{ООФ } S(t): (A_0 - 2t)^2 \geq 16$$

Вычислим момент времени t_0 , в который баржа была удалена на 8 метров от пристани:

$$S(t_0) = 8 \Leftrightarrow \sqrt{(A_0 - 2t_0)^2 - 16} = 8 \Leftrightarrow (A_0 - 2t_0)^2 = 80 \Rightarrow A_0 - 2t_0 = 4\sqrt{5} \Leftrightarrow t_0 = \frac{A_0 - 4\sqrt{5}}{2}.$$

По механическому смыслу производной имеем, что скорость движения баржи равна $S'(t)$, а ускорение равно $S''(t)$.

Вычислим $S''(t)$:

$$S'(t) = \left(\sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16} \right)' = \frac{-4A_0 + 8t}{2\sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16}} = \frac{2(2t - A_0)}{\sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16}};$$

$$S''(t) = (S'(t))' = \frac{4\sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16} - 2 \cdot 2(2t - A_0)(2t - A_0)}{\left((A_0 - 2t)^2 - 16 \right)^2} = \frac{-64}{\left((A_0 - 2t)^2 - 16 \right) \sqrt{(A_0 - 2t)^2 - 16}}.$$

Вычислим значение ускорения в момент времени t_0 :


$$S''(t)|_{t_0} = \frac{-64}{\left(\left(A_0 - 2 \frac{A_0 - 4\sqrt{5}}{2} \right)^2 - 16 \right) \sqrt{\left(A_0 - 2 \frac{A_0 - 4\sqrt{5}}{2} \right)^2 - 16}} = -\frac{1}{8}; \quad [S''(t)] = [1 \text{ м/сек}^2].$$

Ответ: $a = -\frac{1}{8}$ м/сек².

Задача 6

Составить уравнения касательных и нормалей к окружности $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 3 = 0$ в точках ее пересечения с осью OX . Сделать чертеж.

Ответ:



В точке $A(-3;0)$: $x + 2y + 3 = 0$ - уравнение касательной, $2x - y + 6 = 0$ - уравнение нормали;

в точке $B(-1;0)$: $x - 2y + 1 = 0$ - уравнение касательной, $2x + y + 2 = 0$ - уравнение нормали.

Приложение А. Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»

Кафедра цифровых технологий,
математики и экономики

Расчетно-графическая работа
«Приложения дифференциального и интегрального исчислений
функций одной переменной», часть 1
по дисциплине «Математический анализ»

выполнил: студент группы ИВТб-21о

Судов Андрей

проверил: доцент Кацуба В.С.

оценка: _____

дата: _____

Мурманск
2022

Приложение Б. Варианты заданий

Специальности 09.03.01 ИВТ, 09.03.02 ИСТ
дисц. Математический анализ, часть 2

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 1

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = (2x+1)^2 \cdot (2x-1)^2$, $x \in [0; 4]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \sqrt[3]{(x+1)^2 - x - 1}; \quad 2) y = \frac{1}{e^x - 1}; \quad 3) y = \frac{2x+1}{x^2}.$$

Задача 3

Доказать, что конический шатер данной вместимости требует наименьшего количества материи, когда его высота в $\sqrt{2}$ раз больше радиуса основания.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 1,02$.

Задача 5

В какой точке эллипса $16x^2 + 9y^2 = 400$ ордината убывает с такой же скоростью, с какой абсцисса возрастает?

Задача 6

Найти угол между кривыми $y = x^3$ и $y = \frac{1}{x}$ в точке их пересечения. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 2

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 12x^2 - 8x^3 - 2$, $x \in [-1; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = \sqrt[3]{(x-5)^2}$; 2) $y = \frac{3x^4 + 1}{x^3}$; 3) $y = 3 - x \cdot e^{x^2}$.

Задача 3

Бревно длиной 20 метров имеет форму усеченного конуса, диаметры оснований которого равны соответственно 2 метра и 1 метр. Требуется вырубить из бревна балку с квадратным поперечным сечением так, чтобы ось балки совпала бы с осью бревна и объем балки был бы наибольшим. Каковы должны быть размеры балки?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 0,97$.

Задача 5

Тело массой 3 кг движется прямолинейно по закону $s = 1 + t + t^2$; расстояние s выражено в сантиметрах, время t – в секундах. Определить кинетическую энергию $\left(\frac{mv^2}{2}\right)$ тела через 25 секунд после начала движения.

Задача 6

Составьте уравнения касательной и нормали к кривой $y = 3x^2 - x^3$ в точке, где касательная параллельна прямой $y = 3x$. Сделайте чертеж к задаче.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 3

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x^3 + 9x^2 + 12x$, $x \in [-2; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = \sqrt{x^3 - 3x}$; 2) $y = x + \ln(x^2 - 4)$; 3) $y = \frac{x^2 - 5}{x - 3}$.

Задача 3

Прямо над центром круглой площадки фиксированного радиуса $R=2$ метра нужно повесить фонарь. На какой высоте нужно это сделать, чтобы он наилучшим образом освещал дорожку, которой обведена площадка. (Степень освещения некоторой площадки прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.)

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sqrt{\frac{2,037^2 - 3}{2,037^2 + 5}}$.

Задача 5

Точка движется прямолинейно так, что скорость ее изменяется пропорционально квадратному корню из пройденного пути. Показать, что движение происходит под действием постоянной силы.

Задача 6

Какой угол образует с осью абсцисс касательная к кривой $y = \operatorname{sh} x$, проведенная в точке $(0;0)$? Составьте уравнения касательной и нормали к этой кривой в точке $(0;0)$, сделайте чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 4

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x^2 - 2 - x^3$, $x \in [-3; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = (x^2 + 3) \cdot e^{2x}$; 2) $y = \ln x \cdot \sqrt{1 - 2x}$; 3) $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x}$.

Задача 3

Каков должен быть угол при вершине равнобедренного треугольника заданной площади $S = 120$, чтобы радиус вписанного в этот треугольник круга был наибольшим?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 1,04$.

Задача 5

Колесо вращается так, что угол поворота пропорционален квадрату времени. Первый оборот был сделан колесом за 8 секунд. Найти угловую скорость ω через 32 секунды после начала движения.

Задача 6

Найти угол между кривой $y = x - x^3$ и прямой $y = 5x$ в точке их пересечения. Составить уравнения касательной и нормали к кривой в этой точке. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 5

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = x^2 \cdot e^{-x}$, $x \in [-2; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = e^{-x^2+4x}$; 2) $y = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$; 3) $y = \frac{x^2}{2x^2-1}$.

Задача 3

Найти стороны прямоугольника наибольшей площади, вписанного в эллипс $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 0,95$.

Задача 5

Имеется тонкий неоднородный стержень AB . Длина его $L = 20$ см. Масса отрезка AM растет пропорционально квадрату расстояния точки M от точки A , причем известно, что масса отрезка $AM = 2$ см равна 8 г. Найти: а) среднюю линейную плотность отрезка стержня $AM = 2$ см; б) среднюю линейную плотность всего стержня; в) плотность стержня в точке M .

Задача 6

Найти угол между кривыми $y = x^3$ и $y = \frac{1}{x^2}$ в точке их пересечения. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 6

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x - x^3$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = x\sqrt[3]{x^2 - 1}$; 2) $y = \frac{x^3}{e^x}$; 3) $y = \frac{2x+1}{x^2}$.

Задача 3

Найти высоту конуса наименьшего объема, описанного около полушара фиксированного радиуса $R=30$ сантиметров (центр основания конуса лежит в центре шара).

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sqrt{\frac{2,035^2 - 3}{2,035^2 + 5}}$.

Задача 5

Ордината точки, описывающей окружность $x^2 + y^2 = 25$, убывает со скоростью 1,5 см/с. С какой скоростью изменяется абсцисса точки, когда ордината становится равной 4 см?

Задача 6

На кривой $y = x - \ln(x + 2)$ найти точку, в которой касательная параллельна оси абсцисс.

Составить уравнения касательной и соответствующей ей нормали. Сделать чертеж.

Примечание [BK1]: параллельной оси абсцисс

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 7

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 12x^2 - 8x^3 - 2$, $x \in [-1; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = (x^2 - 1) \cdot e^{2x}; \quad 2) y = \ln \sqrt{1 - 2x}; \quad 3) y = \frac{(x+1)^2}{x^2}.$$

Задача 3

На окружности дана точка A . Составить уравнение хорды BC , параллельной касательной в точке A , так чтобы площадь треугольника ABC была наибольшей.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,4988$.

Задача 5

Количество электричества, протекшее через проводник, начиная с момента времени $t = 0$, дается формулой $Q(t) = 2t^2 + 3t + 1$ (кулон). Найти силу тока в конце пятой секунды.

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$ в точке с ординатой $y = 3$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 8

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 6x - 8x^3$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{1}{e^x - 1}; \quad 2) y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1; \quad 3) y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}.$$

Задача 3

Найти угол при вершине осевого сечения конуса наименьшей боковой поверхности, описанного около шара фиксированного радиуса $R = 1$ метр.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 0,975$.

Задача 5

Имеется тонкий неоднородный стержень AB . Длина его $L = 20$ см. Масса отрезка AM растет пропорционально квадрату расстояния точки M от точки A , причем известно, что масса отрезка $AM = 2$ см равна 8 г. Найти: а) среднюю линейную плотность отрезка стержня $AM = 2$ см; б) среднюю линейную плотность всего стержня; в) плотность стержня в точке M .

Задача 6

Найти угол, под которым пересекаются параболы $y = (x - 2)^2$ и $y = -4 + 6x - x^2$. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 9

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = \sqrt{x^2 - 9}$, $x \in [-2; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

1) $y = \sqrt{x-5}$; 2) $y = (x-4)e^{x+3}$; 3) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$.

Задача 3

Найти стороны прямоугольника наибольшего периметра, вписанного в полуокружность фиксированного радиуса $R=20$ сантиметров.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 1,024$.

Задача 5

В какой точке эллипса $16x^2 + 9y^2 = 400$ ордината убывает с такой же скоростью, с какой абсцисса возрастает?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к цепной линии $y = \operatorname{ch}\left(\frac{x}{2}\right)$ в точке, где $x = 2 \ln 2$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 10

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x^3 + 9x^2 + 12x$, $x \in [-2; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = x \cdot e^{-x^2}; \quad 2) y = \frac{x^2 - 4}{x - 3}; \quad 3) y = \sqrt{x^3 - 3x}.$$

Задача 3

Найти высоту конуса наименьшего объема, описанного около полушара фиксированного радиуса $R=60$ сантиметров (центр основания конуса лежит в центре шара).

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sqrt{(3,04)^2 - 5}$.

Задача 5

Определите, при каком значении угла скорости изменения синуса и тангенса этого угла имеют одинаковые значения.

Задача 6

Найти угол между кривыми $x^2 + y^2 = 5$ и $y^2 = 4x$. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 11

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x - x^3$, $x \in [-2; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{1}{x} + 4x^2; \quad 2) y = \frac{e^x}{x}; \quad 3) y = \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^2}.$$

Задача 3

Прямо над центром круглой площадки фиксированного радиуса R нужно повесить фонарь. На какой высоте нужно это сделать, чтобы он наилучшим образом освещал дорожку, которой обведена площадка. (Степень освещения некоторой площадки прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.)

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(1,98)$, если $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 3}$.

Задача 5

Сторона квадрата увеличивается со скоростью $v = 4 \text{ мм/сек}$. Какова скорость изменения периметра и площади квадрата в тот момент, когда длина его стороны равна $a = 16 \text{ см}$?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к астроице: $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos^3 t \\ y = \sqrt{2} \sin^3 t \end{cases}$ в точке, для

которой $t = \frac{\pi}{4}$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 12

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x^3 + 3x^2 - 5$, $x \in [-2; 0]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^3}{(x-1)^2}; \quad 2) y = x \cdot \sqrt[3]{x^2 - 1}; \quad 3) y = \frac{x^3}{e^x}.$$

Задача 3

На странице книги печатный текст должен занимать $S=1000$ квадратных сантиметров. Верхнее и нижнее поля должны быть по $a=5$ см, правое и левое поле – по $b=4$ см. Если принимать во внимание только экономию бумаги, то какими должны быть наиболее выгодные размеры страницы?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,482$.

Задача 5

Колесо вращается так, что угол поворота пропорционален квадрату времени. Первый оборот был сделан колесом за 8 секунд. Найти угловую скорость ω через 32 секунды после начала движения?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к циклоиде: $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ в точке, для

которой $t = \frac{\pi}{2}$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 13

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = x^2(x-2)^2$, $x \in [-2; 1,5]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = 2 \cdot \sqrt[3]{(x-2)^2}$; 2) $y = \frac{e^{2-x}}{2-x}$; 3) $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$.

Задача 3

Найти высоту цилиндра наибольшего объема, который можно вписать в шар фиксированного радиуса $R=50$ см.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,4983$.

Задача 5

Тяжелую балку длиной 13 метров спускают на землю так, что нижний конец прикреплен к вагонетке, а верхний удерживается канатом, намотанным на ворот. Канат сматывается со скоростью 2 м/мин. С каким ускорением откатывается вагонетка в момент, когда она находится на расстоянии 5 м от точки O (рис.1)?




рис.1

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $y = \frac{3-2x}{3x+1}$ в точке её пересечения с осью OY . Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 14

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2 - 3x^2 - x^3$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = 1 - \sqrt[3]{x^2 + x}; \quad 2) y = (x - 2) \cdot e^{3+x}; \quad 3) y = \frac{(x+1)^2}{x^2}.$$

Задача 3

Найти высоту конуса наибольшего объема, который можно вписать в шар фиксированного радиуса $R = 80$ см.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 1,08$.

Задача 5

Количество электричества, протекшее через проводник, начиная с момента времени $t = 0$, дается формулой $Q(t) = 2t^3 + 3t^2 + 1$ (кулон). Найти силу тока в конце пятой секунды?

Задача 6

Составить уравнения касательных и нормалей к кривой $y = (x-1)(x-2)(x-3)$ в точках ее пересечения с осью абсцисс. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 15

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x^3 - 3x^2 - 4$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = x\sqrt{x^2 - 1}; \quad 2) y = \frac{4 - x^3}{x^2}; \quad 3) y = \frac{e^{2x}}{(1+x)^2}.$$

Задача 3

Три пункта A , B и C расположены так, что $\angle ABC = 30^\circ$. Из пункта A выходит автомобиль, а одновременно из пункта B – поезд. Автомобиль движется по направлению к пункту B со скоростью 80 км/ч, поезд – по направлению к пункту C со скоростью 50 км/ч. В какой момент времени (от начала движения) расстояние между поездом и автомобилем будет наименьшим, если $AB = 200$ км?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arctg 0,97$.

Задача 5

Точка движется прямолинейно так, что скорость ее изменяется пропорционально квадратному корню из пройденного пути. Показать, что движение происходит под действием постоянной силы.

Задача 6

Составить уравнения касательных и нормалей к кривой $y = x^2 - x^3$ в точках ее пересечения с осью OX . Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 16

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = \sqrt[3]{C^2 - D^2}$, $x \in [-2; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = \ln(x+4)$; 2) $y = x\sqrt{x+3}$; 3) $y = \frac{x^2+1}{1-4x^2}$.

Задача 3

Из круга фиксированного радиуса $R=2$ м вырезан сектор с центральным углом α . Из сектора свернута коническая поверхность. При каком значении угла α объем полученного конуса будет наибольшим?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sqrt{\frac{2,037^2-3}{2,037^2+5}}$.

Задача 5

Тело массой 3 кг движется прямолинейно по закону $s(t) = 1 - 3t + t^2$; расстояние s выражено в сантиметрах, время t – в секундах. Определить величину кинетической энергии $\left(\frac{mv^2}{2}\right)$ тела через 15 секунд после начала движения.

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к астроице: $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos^3 t \\ y = \sqrt{2} \sin^3 t \end{cases}$ в точке, для

которой $t = \frac{\pi}{4}$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 17

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 6x - 8x^3$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^2}{(x-1)^2}; \quad 2) y = \frac{x^3}{e^x}; \quad 3) y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 1.$$

Задача 3

Найти высоту прямого кругового конуса наименьшего объема, описанного около шара фиксированного радиуса R .

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,4985$.

Задача 5

Поезд и воздушный шар отправляются в один и тот же момент из одного пункта. Поезд движется равномерно со скоростью 50 км/ч, шар поднимается (тоже равномерно) со скоростью 10 км/ч. С какой скоростью они удаляются друг от друга?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к циклоиде: $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ в точке, для которой

$t = \frac{\pi}{2}$. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчислений функций одной переменной», часть 1

Вариант 18

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = x^3(x-1)$, $x \in [-2; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = \frac{4-x^3}{x^2}$; 2) $y = \sqrt[3]{(x^2-4)^2}$; 3) $y = \frac{x^3}{e^x}$.

Задача 3

На странице книги печатный текст должен занимать $S=600$ квадратных сантиметров. Верхнее и нижнее поля должны быть по $a=2$ см, правое и левое – по $b=1,5$ см. Если принимать во внимание только экономию бумаги, то какими должны быть наиболее выгодные размеры страницы?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arccos 0,501$.

Задача 5

Ордината точки, описывающей окружность $x^2 + y^2 = 25$, убывает со скоростью 1,5см/сек. С какой скоростью изменяется абсцисса точки, когда ордината становится равной 4см?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $y = \frac{4-x^3}{x^2}$ в точке её пересечения с осью абсцисс. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 19

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x^2 - 2 - x^3$, $x \in [-2; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = 10 \cdot \sqrt[3]{(x-4)^2}; \quad 2) y = (x-1) \cdot e^{2x}; \quad 3) y = \frac{x^2 - 4}{x+1}.$$

Задача 3

Три пункта A , B и C расположены так, что $\angle ABC = 60^\circ$. Из пункта A выходит автомобиль, а одновременно из пункта B – поезд. Автомобиль движется по направлению к B со скоростью 70 км/ч, поезд – по направлению к C со скоростью 50 км/ч. В какой момент времени (от начала движения) расстояние между поездом и автомобилем будет наименьшим, если $AB = 300$ км?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\operatorname{arcsctg} 1,08$.

Задача 5

Сторона квадрата увеличивается со скоростью $v = 2 \text{ см/мин}$. Какова скорость изменения периметра и площади квадрата в тот момент, когда длина его стороны равна $a = 25 \text{ см}$?

Задача 6

Написать уравнения касательной и нормали к кривой $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$ в точке с ординатой $y = 3$. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 20

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = x^2(x-2)^2$, $x \in [-2; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^3}{(x-1)^2}; \quad 2) y = (x-2) \cdot e^{3+x}; \quad 3) y = x\sqrt{x+3}.$$

Задача 3

Найти высоту цилиндра наибольшего объема, который можно вписать в шар фиксированного радиуса R .

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,46$.

Задача 5

Радиус круга изменяется со скоростью $v = 5 \text{ мм/сек}$. Какова скорость изменения длины окружности и площади круга в тот момент, когда радиус равен $r = 20 \text{ см}$?

Задача 6

Какой угол образует с осью абсцисс касательная к кривой $y = \operatorname{sh} x$, проведенная в точке $(0;0)$. Составить уравнения касательной и нормали к кривой в этой точке. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 21

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2 - 3x^2 - x^3$, $x \in [-2; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^2}{(x+1)^2}; \quad 2) y = \sqrt[3]{(x^2-3)^2}; \quad 3) y = x - \ln(x+2).$$

Задача 3

Найти высоту конуса наибольшего объема, который можно вписать в шар фиксированного радиуса R .

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arccos 0,48$.

Задача 5

Радиус шара изменяется со скоростью $v = 2 \text{ см} / \text{мин}$. Определите, с какой скоростью изменяются объем и площадь поверхности шара.

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к цепной линии $y = \text{ch}\left(\frac{x}{2}\right)$ в точке, где $x = 2 \ln 2$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 22

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x^3 + 9x^2 + 12x$, $x \in [-2; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{x^3}{x^2 - 4}; \quad 2) y = 4\sqrt[3]{(x-2)^2}; \quad 3) y = x - \ln(x-2).$$

Задача 3

Докажите, что конический шатер данной вместимости требует наименьшего количества материи, когда его высота в $\sqrt{2}$ раз больше радиуса основания.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sqrt{(5,02)^2 - 9}$.

Задача 5

Определите, при каком значении угла скорости изменения синуса и тангенса одного и того же угла имеют одинаковые значения.

Задача 6

Найти угол между кривой $y = x - x^3$ и прямой $y = 5x$ в точке их пересечения. Составить уравнения касательной и нормали к кривой в этой точке. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 23

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = x^2 e^x$, $x \in [-1; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств следующих функции и построить их графики:

$$1) y = \frac{1}{e^x - 1}; \quad 2) y = x + \sqrt{1+x}; \quad 3) y = \frac{x^3}{3-x^2}.$$

Задача 3

Через данную точку $P(1;4)$ провести прямую так, чтобы сумма длин положительных отрезков, отсекаемых ею на координатных осях, была наименьшей.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sin 80^\circ$.

Задача 5

Радиус круга изменяется со скоростью $v = 3 \text{ см} / \text{мин}$. Какова скорость изменения длины окружности и площади круга в тот момент, когда его радиус равен $r = 30 \text{ см}$?

Задача 6

Найти угол между кривыми $y = x^3$ и $y = \frac{1}{x^2}$ в их общей точке. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 24

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 16x^3 + 12x^2 - 5$, $x \in [-2; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}$; 2) $y = \left(\frac{x}{x+2}\right)^2$; 3) $y = \frac{x^2}{2} \cdot \ln x$.

Задача 3

Какова должна быть высота конуса, вписанного в шар фиксированного радиуса $R=1,5$ м, для того чтобы его боковая поверхность была наибольшей?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,4983$.

Задача 5

Тяжелую балку длиной 13 метров спускают на землю так, что нижний конец прикреплен к вагонетке, а верхний удерживается канатом, намотанным на ворот. Канат сматывается со скоростью 2 м/мин. С каким ускорением откатывается вагонетка в момент, когда она находится на расстоянии 5 м от точки O (рис.1)?




рис.1

Задача 6

Показать, что гиперболы $xy=1$ и $x^2 - y^2 = 4$ пересекаются под прямым углом. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 25

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x - x^3$, $x \in [-1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) ~~$y = 2x^2 - 3\sqrt{x+1}$~~ ; 2) $y = \frac{x^3 - 4}{x^2}$; 3) $y = x + \frac{\ln x}{x}$.

Задача 3

Через данную точку $P(1;4)$ провести прямую так, чтобы сумма длин положительных отрезков, отсекаемых ею на координатных осях, была наименьшей.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(1,15)$, если $f(x) = e^{0,1x(1-x)}$.

Задача 5

Поезд и воздушный шар отправляются в один и тот же момент из одного пункта. Поезд движется равномерно со скоростью 50 км/ч, шар поднимается (тоже равномерно) со скоростью 5 км/ч. С какой скоростью и с каким ускорением они удаляются друг от друга?

Задача 6

Показать, что кривые $y = 4x^2 + 2x - 8$ и $y = x^3 - x + 10$ касаются друг друга в точке $(3;34)$. Выполнить построение.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 26

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке,

построив ее график на этом промежутке, если $y = x + \frac{\ln x}{x}$, $x \in [1; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = 2 - 3 \cdot \sqrt[3]{(x+1)^2}; \quad 2) y = \frac{x^3 - 4}{x^2}; \quad 3) y = e^{-x^2 + 2x}.$$

Задача 3

Бревно длиной 10 метров имеет форму усеченного конуса, диаметры оснований которого равны соответственно 2 метра и 1 метр. Требуется вырубить из бревна балку с квадратным поперечным сечением так, чтобы ось балки совпала бы с осью бревна и объем балки был бы наибольшим. Каковы должны быть размеры балки?

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(-1,15)$, если $f(x) = e^{0,1x(1+x)}$.

Задача 5

Количество электричества, протекшее через проводник, начиная с момента времени $t = 0$, дается формулой $Q = 2t^3 + 3t^2 + 1$ (кулон). Найти, чему равна величина силы тока в конце десятой секунды.

Задача 6

В каких точках касательная к кривой $y = \frac{2x}{4+x^2}$ параллельна оси абсцисс? Составить уравнения касательной и нормали к этой кривой в одной из найденных точек. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 27

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = \sqrt[3]{x+2}$, $x \in [-3; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = x^3 \cdot e^{-x}$; 2) $y = \frac{2(x^2 - 4)}{(x+1)^2}$; 3) $y = x - \frac{\ln x}{x}$.

Задача 3

Определите, чему равна высота прямого кругового конуса наименьшего объема, описанного около шара фиксированного радиуса $R=2,5$ м.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно значение $\arctg 1,05$.

Задача 5

Тело массой 2кг движется прямолинейно по закону $s(t) = 1 - 2t + t^2$; расстояние s выражено в сантиметрах, время t – в секундах. Определить кинетическую энергию $\left(\frac{mv^2}{2}\right)$ тела через 15 с после начала движения.

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $y = \frac{3-2x}{3x+1}$ в точке её пересечения с осью ординат. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 28

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 2x\sqrt{x+5}$, $x \in [-2; 0]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = (x^2 - 1) \cdot e^x$; 2) $y = \frac{x^3 - 4}{x^2}$; 3) $y = x + \frac{\ln x}{x}$.

Задача 3

Найти высоту конуса наибольшего объема, если такой конус вписан в шар радиуса 1,5м.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно значение $\sin 85^\circ$.

Задача 5

Три пункта A , B и C расположены так, что $\angle ABC = 45^\circ$. Из пункта A выходит автомобиль, а одновременно из пункта B – поезд. Автомобиль движется по направлению к B со скоростью 70 км/ч, поезд – по направлению к C со скоростью 50 км/ч. В какой момент времени (от начала движения) расстояние между поездом и автомобилем будет наименьшим, если $AB = 200$ км?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $y = \frac{4 - x^3}{x^2}$ в точке её пересечения с осью абсцисс. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 29

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x^2 + x^3$, $x \in [-2; 1]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) ~~$y = 2x^2 + \sqrt{x+5}$~~ ; 2) $y = \frac{x^3 - 9}{x^2}$; 3) $y = 2x + \frac{\ln x}{x}$.

Задача 3

Определите высоту конуса, вписанного в шар фиксированного радиуса $R=2m$ и имеющего наибольшую площадь боковой поверхности.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\arcsin 0,488$.

Задача 5

Радиус круга изменяется со скоростью 2 мм/сек . Определите скорость изменения длины окружности и площади круга в тот момент, когда его радиус равен $r = 3 \text{ см}$.

Задача 6

На кривой $y = x - \ln(x + 2)$ найти точку, в которой касательная параллельна оси абсцисс, и составить уравнения касательной и нормали в этой точке. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 30

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 3x^2 - x^3$, $x \in [-1; 2]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) ~~$y = 2x^2 - 3\sqrt{x+1}$~~ ; 2) $y = \frac{x^3 - 4}{x^2 - 1}$; 3) $y = x + \frac{\ln x}{x}$.

Задача 3

Через данную точку $P(2;4)$ провести прямую так, чтобы сумма длин положительных отрезков, отсекаемых ею на координатных осях, была наименьшей.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(1,25)$, если $f(x) = e^{0.1x(1-x)}$.

Задача 5

Поезд и воздушный шар отправляются в один и тот же момент из одного пункта. Поезд движется равномерно со скоростью 50 км/ч, шар поднимается (тоже равномерно) со скоростью 10 км/ч. С какой скоростью и с каким ускорением они удаляются друг от друга?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой $x^3 + y^2 + 2x - 6 = 0$ в точке $(-1;3)$.

Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 31

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 4x - tgx$, $x \in [-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = 2x - 3\sqrt[3]{x^2}$; 2) $y = \frac{(x-1)^2}{x^2 - 4}$; 3) $y = x + \ln(\cos x)$.

Задача 3

Два самолета летят в одной плоскости и прямолинейно под углом 120 градусов и с одинаковой скоростью v км/час. В некоторый момент один самолет оказался в точке пересечения траекторий движения, а второй не долетел до неё на a км. Определите, через сколько времени между самолетами будем наименьшим и чему равно это расстояние.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $f(-1, 2)$, если $f(x) = e^{0,2x(1+x)}$.

Задача 5

Колесо радиуса a катится по прямой. Угол φ поворота колеса за t секунд определяется равенством $\varphi = t + 0,5t^2$. Определите скорость и ускорение движения центра колеса.

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к кривой, которая называется разверткой круга и описывается уравнениями $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$ в её точке с $t = \frac{\pi}{4}$.

Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 32

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке, построив ее график на этом промежутке, если $y = 1 - \sqrt[3]{(x-4)^2}$, $x \in [-1; 5]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

$$1) y = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}; \quad 2) y = \frac{3-x^2}{x+2}; \quad 3) y = x^2 e^{-x}.$$

Задача 3

Определите размеры открытого бассейна объёмом 32 м^3 с квадратным дном так, чтобы на облицовку его стен и дна пошло наименьшее количество материала.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\cos 100^\circ$.

Задача 5

Вращающееся маховое колесо, задерживаемое тормозом, за t секунд поворачивается на угол $\varphi = a + bt - ct^2$, где a, b, c - положительные постоянные. Определите угловую скорость и ускорение вращения. В какой момент времени колесо остановится?

Задача 6

Составить уравнения касательной и нормали к астроиде $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ в точках её пересечения с прямой $y = x$. Сделать чертеж.

РГР «Приложения дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной», часть 1

Вариант 33

Задача 1

Найти наибольшее и наименьшее значения функции $y = f(x)$ на замкнутом промежутке,

построив ее график на этом промежутке, если $y = \frac{1 + \ln x}{x}$, $x \in [0,5; 3]$.

Задача 2

Провести полное исследование свойств каждой из следующих функций и построить их графики:

1) $y = \frac{4\sqrt{x}}{x+2}$; 2) $y = \frac{x^2}{x-2}$; 3) $y = xe^{-0,5x}$.

Задача 3

Боковые стороны и меньшее основание трапеции равны по 10 сантиметров. Определить её большее основание так, чтобы площадь трапеции была наибольшей.

Задача 4

Используя равенство $\Delta f \approx df$, вычислить приближенно $\sin 100^\circ$.

Задача 5

Зенитный снаряд выброшен вертикально вверх с начальной скоростью a м/сек. Определить, на какой высоте x он будет находиться через t секунд. Через сколько секунд снаряд достигнет наивысшей точки и на каком расстоянии от земли?

Задача 6

Определить угол, под которым пересекаются линии $x^2 + y^2 = 5$ и $y^2 = 4x$. Сделать чертеж.

Примечание [BK2]:

Примечание [BK3]:

Примечание [BK4]:

Примечание [BK5]:

Примечание [BK6]:

Примечание [BK7]: