

Приложение 2 к РПД
Методика решения задач
с параметрами в средней школе
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
направленность (профили)
Математика. Информатика
Форма обучения – очная
Год набора – 2023

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Общие сведения

1.	Кафедра	Математики, физики и информационных технологий
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	Направленность (профили)	Математика. Информатика
4.	Дисциплина (модуль)	Б1.В.ДВ.01.01 Методика решения задач с параметрами в средней школе
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2023

2. Перечень компетенций

<p>УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p> <p>ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач</p>
--

3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции (разделы, темы дисциплины)	Формируемая компетенция	Критерии и показатели оценивания компетенций			Формы контроля сформированности компетенций
		Знать:	Уметь:	Владеть:	
Основные методы решения задач с параметрами	УК-2 ПК-1	<ul style="list-style-type: none"> – основные типы задач с параметрами; – методы решения основных типов задач с параметрами; – методику обучения учащихся решению школьных задач с параметрами 	<ul style="list-style-type: none"> – решать и обосновывать задачи с параметрами; – решать практико-ориентированные задачи по разделам курса; – решать основные типы задач, предлагавшихся на ЕГЭ в предыдущие годы 	<ul style="list-style-type: none"> – основными методами решения школьных математических задач с параметрами; – математическим аппаратом, необходимым при решении задач с параметрами; – подбором задач, организацией и проведением занятий со школьниками по решению задач; – методикой обучения учащихся решению школьных задач с параметрами 	<ul style="list-style-type: none"> Активность на практических занятиях Выполнение домашних заданий Выполнение индивидуального задания Контрольная работа
Линейные уравнения, неравенства и их системы	УК-2 ПК-1				
Квадратные уравнения	УК-2 ПК-1				
Квадратные неравенства	УК-2 ПК-1				
Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами	УК-2 ПК-1				

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы:

«неудовлетворительно» – 60 баллов и менее; «удовлетворительно» – 61-80 баллов; «хорошо» – 81-90 баллов; «отлично» – 91-100 баллов

4. Критерии и шкалы оценивания

4.1. Активность на практических занятиях

Процент правильных ответов	До 60	61-80	81-90	91-100
Количество баллов за активность на занятии	0,2	0,6	0,8	1

4.2. Выполнение домашнего задания

Процент правильных ответов	До 60	61-80	81-90	91-100
Количество баллов за выполненное домашнее задание	0,2	0,5	0,8	1

4.3. Выполнение индивидуального задания

Процент правильных ответов	До 60	61-80	81-90	91-100
Количество баллов за выполненное индивидуальное задание	5	10	15	20

1.4. Выполнение контрольной работы

Процент правильно решенных заданий	До 60	61-80	81-90	91-100
Количество баллов за выполнение контрольной работы	5	10	15	20

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

5.1. Типовое домашнее задание

Задача. Известно, что уравнение $(2p+3)x^2 + (p+3)x + 1 = 0$ имеет хотя бы один корень. Найдите все значения параметра P , при которых число различных корней этого уравнения равно числу различных корней уравнения $\frac{2x+1}{21-p} = \frac{1}{\sqrt{x-3}+3}$.

1 способ. Введем новую переменную $t = \sqrt{x-3}$, $x = t^2 + 3$, $t \geq 0$. Тогда при $p \neq 21$ второе уравнение примет вид $(2(t^2 + 3) + 1)(t + 3) = 21 - p \Leftrightarrow 2t^3 + 6t^2 + 7t + p = 0$.

Покажем, что функция $\varphi(t) = 2t^3 + 6t^2 + 7t + p$ возрастает при $t \geq 0$. Это следует из того, что $\varphi'(t) = 6t^2 + 12t + 7 > 0$.

Таким образом, уравнение $\varphi(t) = 0$ имеет не более одного корня и условиям задачи удовлетворяют те значения P , при которых оба уравнения имеют единственное решение. Первое уравнение имеет единственный корень в следующих случаях:

1. $2p + 3 = 0 \Leftrightarrow p = -1,5$, $x = -\frac{2}{3}$.

2. $D = 0 \Leftrightarrow (p+3)^2 - 4(2p+3) = 0 \Leftrightarrow p^2 - 2p - 3 = 0$, $p = -1$, $p = 3$.

Проверим, имеет ли второе уравнение решение при этих значениях P .

а) $p = -1,5$. $\varphi(0) = -1,5 < 0$, $\varphi(1) = 15 - 1,5 = 13,5 > 0$. Уравнение $\varphi(x) = 0$ имеет корень на интервале $(0;1)$.

б) $p = -1$. $\varphi(0) = -1 < 0$, $\varphi(1) = 14 > 0$. Уравнение $\varphi(t) = 0$ имеет корень на интервале $(0;1)$.

в) $p = 3$. Уравнение $\varphi(t) = 0 \Leftrightarrow 2t^3 + 6t^2 + 7t + 3 = 0$ не имеет решений ($t \geq 0$).

2 способ. Второе уравнение запишем в виде $f(x) = g(x)$, где $f(x) = \frac{2x+1}{21-p}$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-3}+3}$, $x \geq 3$.

Так как $g(x) > 0$, то уравнение $f(x) = g(x)$ может иметь решения только при $p < 21$, поскольку $2x+1 > 0$ при $x \geq 3$. Выясним характер поведения функций f и g . f — линейная функция,

$$k = \frac{2}{21-p} > 0, \text{ поэтому } f \text{ возрастает, } E(f) = \left[\frac{7}{21-p}; +\infty \right).$$

$$g \text{ — убывающая функция, множество ее значений } E(g) = \left(0; \frac{1}{3} \right].$$

Это означает, что уравнение $f(x) = g(x)$ на множестве $[3; +\infty)$ может иметь не более одного решения. Как и в первом способе решения, находим значения $p = -1,5$, $p = -1$ и $p = 3$, при которых первое уравнение имеет единственное решение. Проверка «подозрительных» значений параметра p заключается в следующем:

если $f(3) \leq g(3)$, то уравнение $f(x) = g(x)$ имеет решение, если же $f(3) > g(3)$, то решений нет.

а) $p = -1,5$. $f(3) = \frac{7}{21+1,5} = \frac{14}{45} < \frac{1}{3} = g(3)$.

б) $p = -1$. $f(3) = \frac{7}{21+1} = \frac{7}{22} < \frac{1}{3} = g(3)$.

в) $p = 3$. $f(3) = \frac{7}{21-3} = \frac{7}{18} > \frac{1}{3} = g(3)$.

Условиям задачи удовлетворяют значения $p = -1,5$ и $p = -1$.

Ответ: $\{-1,5; -1\}$.

5.2. Типовая контрольная работа

- Найдите все значения параметра p , при каждом из которых число различных корней уравнения $\frac{(7p+3)x+35p-2}{x+5} = p^2+3$ равно числу различных корней уравнения $(p+3)x^2+2x(p+9)+27=0$.
- Найдите все ненулевые значения a , при каждом из которых наибольшее из двух чисел $b = 2 - 2a^{-2} - 7|a|^{-1}$ и $c = 2a^2 - 7|a| - 4$ не превосходит -7 .
- Найдите все значения a , большие 1, при каждом из которых наименьшее из двух чисел b и c не меньше -4 , если $b = \log_5^2 a - \log_5(25a^4) + 1$, а $c = 9 - \log_a(625a) - \log_a^2 5$.
- Найдите все значения A , при каждом из которых оба числа $2\cos a + 9$ и $2\cos 2a + 4\cos a + 4$ являются решениями неравенства $\frac{2 - \log_2|x-5|}{(49 + 7x - 2x^2)\sqrt{x+1}} \leq 0$.
- Найдите все значения a , для которых при каждом x из промежутка $(-5; -2]$ значение выражения $x^2 - 4|x|$ не равно значению выражения $a|x| + 4$.

Ключ

№ вопроса	Правильные ответы
1	$\{-3; 7; 9\}$
2	$\left[-1; -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right]$
3	$a \in [\sqrt{5}; 5] \cup [125; +\infty)$
4	$\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$
5	$a \in (-\infty; -4) \cup [0, 2; +\infty)$

5.3. Типовое индивидуальное задание

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Методика решения тригонометрических уравнений с параметрами.
- Методика решения тригонометрических неравенств с параметрами.
- Методика решения показательных уравнений и неравенств с параметрами.
- Методика решения логарифмических уравнений с параметрами.
- Методика решения логарифмических неравенств с параметрами.
- Методика решения систем уравнений и неравенств, содержащих параметры.
- Методика решения уравнений и неравенств с параметрами, содержащих модуль.
- Методика решения заданий ЕГЭ с параметрами (уровень С, задание 18).

5.4. Вопросы к зачету:

- Типы задач с параметрами.
- Параметр и поиск решений уравнений, неравенств и их систем (ветвление).
- Аналитический метод решения задач с параметрами.
- Геометрический метод решения задач с параметрами.
- Метод решения относительно параметра.
- Алгоритм решения линейных уравнений с параметром.

7. Решение линейных уравнений с параметром.
8. Решение линейных неравенств с параметром.
9. Параметр и количество решений системы линейных уравнений.
10. Решение систем линейных уравнений с параметром.
11. Решение систем линейных неравенств с параметром.
12. Свойство квадратного трехчлена. Алгоритмическое предписание решения квадратных уравнений с параметром.
13. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром.
14. Расположение корней квадратичной функции относительно заданной точки.
15. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции.
16. Решение квадратных уравнений с параметром первого типа (“для каждого значения параметра найти все решения уравнения.”)
17. Решение квадратных уравнений второго типа (“найти все значения параметра при каждом из которых уравнение удовлетворяет заданным условиям”).
18. Решение квадратных неравенств с параметром первого типа.
19. Решение квадратных неравенств с параметром второго типа.
20. Решение квадратных неравенств с модулем и параметром.
21. Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами.
22. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств.
23. Использование симметрии аналитических выражений.